

Verslag excursie: Borkeld

Datum : Zondag - 4 oktober 2015

Deelnemers : 6

het Weer : Zon

Coördinatie : Wytze Boersma



Op de mooiste, misschien wel de laatste mooie na zomerdag zondag van dit jaar hadden 6 mensen er wel zin om naar de Borkeld bij Markelo te gaan.

Geen van allen heeft hiervan spijt van gehad. Het weer was ideaal en we hebben mooie, leuke en interessante dingen gezien.

De start van de excursie begon met een uitzicht over het gebied vanaf de Friezenberg. Maar door de mist was het gezicht beperkt.

Wel zagen we talloze spinnenwebben in het dorre gras en bramenstruiken. Je kon goed het verschil zien tussen de staande wielwebben en de liggende hang- of valwebben.

Voordat we het hoogste punt hadden bereikt, hadden we al vele paddenstoelen soorten gezien. Zoals het Gewone zwavelkopje, Dennenvlamhoed, Melksteelmycena en de Gewone krulzoom.

De planten werden ook niet overgeslagen. Zo zagen we Liggend walstro, Rankende helmblom en de nog bloeiende Biggenkruid en Brunel.

Via het pad gingen we omlaag en kwamen we langs voormalige weilanden. Ondertussen kwam de zon te voorschijn. Hierdoor kwam het begin van de verkleuring van het blad beter naar voren.

Echt een verschijnsel van de aankomende herfst. Van de weilanden is de teellaag verwijderd. Het Jacobskruid, dat daar massaal is opgekomen moet een prachtig gezicht hebben gegeven.

Dit was goed te zien aan overblijvende staande stengels. Of dit zo goed is geweest voor de omgeving moet worden afgewacht. In dit gebied zagen we de Gele ringboleet en de Baardige melkzwam.

Iets verderop kwamen we in een gebied dat al langer geleden is omgezet naar natuurgebied. De Struikheide ontwikkelt zich daar goed. Hier en daar vonden we struikjes van Stekelbrem.

Even verder zagen we volop, nog in bloei staande Kruipbrem. Deze soort gaat sterk achteruit en staat op de rode lijst als kwetsbaar. Het is een typische indicatiesoort voor natura 2000.

Voor 1990 waren er nog 614 atlasblokken (5x5km) met Kruipbrem. Na 1990 nog maar 361. Samen met Stekelbrem vormt Kruipbrem een aparte associatie binnen de plantengemeenschap van droge heiden.

Weer wat verder, in het lagere deel zagen we een paar planten van Grondster. Dit is ook een soort die sterk achteruit gaat. 560 atlashokken voor 1990. Na 1990 nog maar 361.

Het is een soort van matige, voedselarme kalkarme en stikstofarme zure grond die 's-winters onder water staat. De achteruit gang is waarschijnlijk te wijten aan ontwatering en het stoppen van kleinschalig onderhoud.

Vroeger zag je Grondster nog al eens langs de fietspaden van de onverharde wegen. Weer wat verder zagen we nog een paar Berkenboleten staan bij jonge berkenboompjes.

De grijze buisjes en de gestippelde steel zijn de onmisbare kenmerken voor deze soort. Via een vlonder pad kwamen we in een recentelijk afgeplagd gebied.

Onderweg vonden we nog een Kopergroenzwam met zijn donker bruine plaatjes. Naast de talrijke fopzwammen zagen we vele Franjezwammen. Hierna via het fietspad weer terug naar de parkeerplaats.

Ondertussen zagen we vele zwavelkoppen in allerlei stadia staan. Toen we even stil stonden zagen we wel duizend Eikelbekertjes staan.

Deze kleine bekertjes hadden we niet gezien als we waren doorgelopen. Je ziet maar weer dat je vaker moet stilstaan en door de knieën moet .

Waargenomen soorten

Vogels

Boomklever

Boomleeuwerik

Gaai

Graspieper

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Kolgans

Zwarte Kraai

Planten & Mossen

Akkerdistel

Bezemkruid

Bochtige smele

Bosveldkers

Dicht havikskruid

Dwergviltkruid

Framboos

Geplooid stokbraam

Gewone ereprijs

Gewone vuilboom

Grasmuur

Hazenpootje

Klein streepzaad

Kruipbrem

Liggend walstro

Moeraswolfsklauw

Pilzegge

Rankende helmbloem

Robinia

Sint-Janskruid

Speerdistel

Tengere rus

Vertakte leeuwentand

Witte klaver

Zomerfijnstraal

Paddenstoelen

Amethistzwam

Botercollybia

Eikelbekertje

Gele korstzwam

Gewone fopzwam

Gewone krulzoom

Grote parasolzwam

Koeienboleet

Nevelzwam

Platte tonderzwam

Rode zwavelkop

Vliegzwam

Insecten

Kleine Vuurvlinder

Merel

Amerikaans krentenboompje

Blauwe zegge

Bosaardbei

Brede stekelvaren

Drienerfmuur

Es

Geelgroene zegge

Gewone brunel

Gewone hennepnetel

Gewoon biggenkruid

Grondster

Hondsdrif

Klein vogelpootje

Kruipende boterbloem

Mannetjesereprijs

Muizenoor

Pitrus

Reukeloze kamille

Rode klaver

Smalle stekelvaren

Stekelbrem

Tormentil

Vlasbekje

Wolfspoot

Baardige melkzwam

Dennenvlamhoed

Gele aardappelbovist

Gele ringboleet

Gewone franjezwam

Gewone zwavelkop

Kastanjeboleet

Kopergroenzwam

Parelamaniet

Regenboogrussula

Roodbruine slanke amaniet

Waaierkorstzwam

Vink

Amerikaanse vogelkers

Bleekgele droogbloem

Bosdroogbloem

Bruine snavelbies

Duizendblad

Fioringras

Geoorde wilg

Gewone dophei

Gewone paardenbloem

Gewoon struisgras

Grote weegbree

Jakobskruid

Korenbloem

Late guldenroede

Moerasdroogbloem

Pijpenstrootje

Prikneus

Reuzenbalsemien

Schermhavikskruid

Smalle weegbree

Struikhei

Trekruis

Wilde lijsterbes

Zachte duizendknoop

Bleekgele russula

Doolhofzwam

Gele knolamaniet

Gewone berkenboleet

Gewone heksenboleet

Gewoon elfenbankje

Knotsvoettrichterzwam

Melksteelmycena

Parelstuijzwam

Rimpelende melkzwam

Rossige melkzwam

Wortelende aardappelbovist