

# Verslag Gewestelijke Excursie: Junner Koeland

**Datum** : zaterdag 2 mei 2008

**Deelnemers** : 17

**het Weer** : Zonnig en warm

**Coördinatie** : Geert Euverman  
(Staatsbosbeheer)



Het Junner Koeland is één van de fraaiste voorbeelden van een door de Vecht geboetseerd landschap. Het terrein bestaat uit een opeenvolging van rivierduintjes en kronkelwaarden, omsloten door een oude loop van de rivier.

Het was vroeger de gemeenschappelijke weide van de Junner boeren en ook nu wordt het gebied nog steeds begraaasd door paarden en koeien.

Paarden zijn toegevoegd omdat door een ziekte het aantal konijnen sterk is afgenomen waardoor het karakter van open grasland dreigde te verdwijnen. Met de inzet van onder meer paarden is nu veel van de oude vegetatie opgeruimd.

Vegetaties van heel verschillende omstandigheden zijn hier te bewonderen, met het meest in het oog springend natuurlijk de stroomdalvegetatie op de nestbulten of -koepels van de gele weidemier.

Op de bulten stond akkerhoornbloem, geel walstro, zwolse anjer, tijm en voorjaarszegge.

In de grazige vegetatie tussen de bulten zagen we knolboterbloem, vleugeltjesbloem (enkele planten), zandzegge, hondsviooltje, grasklokje, borstelgras, tandjesgras, zachte ooievaarsbek, tijmeprijs en gewone ereprijs.

Op wat meer zandige delen stond buntgras, gewone spurrie en klein tasjeskruid. Dat het om een schraal gebied gaat, bleek onder andere uit het voorkomen van de zandpaardebloem met een gedraaid blad (*Taraxacum laevigatum* microsoort *tortilobum*).

In en nabij de wat lager gelye delen van het gebied (oude lopen en kronkelwaarden) groeiden waterranonkel, wateraardbei, wederik, polei, engelse alant, poelruit, gele waterkers en moerasspirea.

Het halfopen, parkachtige landschap is ook heel aantrekkelijk voor vogels en vlinders.

Waargenomen vogels: zomertortel, boompieper, goudvink, geelgors, rietgors, grasmus, meerkoet, fuut en roodborsttapuit.

Waargenomen vlinders: hooibeestje, kleine vuurvlinder, distelvlinder, jacobsvlinder, mi-vlinder en zuringspanner.

Buiten het eigenlijke koeland lag een dotterbloemhooiland met veel dotterbloem, moerasspirea en pinksterbloem. Het hooiland maakt deel uit van het begraaasde gebied waardoor het flink is vertrappt. Op het hooiland is eerder brede orchis gezien.

Bert Oude Egbrink

